



THATCHEATER

Redukuje obsah plste na vysoko zaťažovaných trávnikoch. Jedna aplikácia za pri požadovanej aplikácii a údržbe, účinkuje až 6 mesiacov. Garantovaný účinok.

BENEFITY

- Rozkladá plst' a zvyšuje dostupnosť živín
- Zlepšuje povrchovú drenáž a vytvára pevný povrch
- Preventívne pôsobí proti vzniku čiernej vrstvy
- Zvyšuje vitalitu trávniku a odolnosť proti opotrebovaniu
- Podporuje rozvoj koreňov a zvyšuje hustotu trávniku
- Uvoľňuje „potravu“ pre huby a podporuje rast trávniku
- Garantovaný výsledok

ThatchEater

Aplikujte ThatchEater na jar a pravidelne prevzdušňujte.

V pokusoch a mätónom sa dosiahla o 42 % vyššia priepustnosť koreňovej zóny po aplikácii ThatchEateru ako pri kontrole.


Baktérie a huby obsiahnuté v Thatcheateri významne degradujú/ rozkladajú viacej plste ako v kontrole.

Aplikácia: *Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, kontaktujte zástupcu Symbio.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

N	P	K	MgO	Fe
0.26	0	5.8	0	0

GUIDE ONLY Single Pass Only using Scotts Accupro 2000			
Granular Size Range (mm)	Cone Settings	Effective Width (m)	Setting 50g/m ²
0.5 - 1.8	4	4.2	R



Balenie
25Kg

50g/m²

0.5 – 1.5mm



Pred aplikáciou
Thatcheater



Po 9 dňoch



Po 83 dňoch

SYMBIO THATCHEATER je zmes je zmes prospešných pôdnych húb a baktérií špeciálne vybraných pre ich schopnosť rýchlo odbúravať plst' a organickú hmotu, premieňať ich na humus a uvoľňovať zablokované živiny pre rast rastlín.

Uvoľňovanie živín počas degradácie plsti znamená, že je potrebné menšie množstvo hnojív. Technológia biofixácie sa používa na zlepšenie metabolizmu prospešných mikroorganizmov a ich ochranu pred UV svetlom a chemikáliami. Fungicídy možno použiť po siedmich dňoch od aplikácie.

Hektár športového trávniku s plstou 4 cm sa obsahuje približne 200 m³ - 400 m³ plsti. Degradácia takeho množstva plsti vyžaduje veľa kyslíka. Časté prevzdušňovanie pevnými hrotmi je nevyhnutné pre proces degradácie plste a uvoľňovanie živín. Pre dodanie kyslíka sa odporúča aplikácia prípravku Liquid Aeration.

Ako aplikovať:

- Používajte vo vegetačnom období, keď je teplota pôdy 5°C a viac.
- Pre najlepšie výsledky aplikujte na jar/leto.
- Prevzdušňujte trávnik pravidelne dutými hrotmi.
- Aplikujte v množstve 50 g na m² do, ale nie pod vrstvu plste, pomocou rotačného rozmetadla alebo zmiešajte so osivom pri doseve.
- Po aplikácii zavlažte trávnik a pravidelne zavlažujte.
- Pre rýchlu degradáciu plsti používajte spolu s hnojivami Symbio s nízkym indexom soli a biostimulantmi, ktoré zvyšujú biologickú aktivitu ThatchEateru
- Aby ste predišli odkysličeniu plsti podmäčkaním, zavlažujte vodu s mierou