



2-3

Landscaper Pro[®]

Spring & Summer

At to roste

20 | 0 | 7 | 9 | 3.0
N | P₂O₅ | K₂O | CaO | MgO

Popis

Vysoce účinné hnojivo pro hlavní růstovou fázi

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	20%
	Močovinový dusík (N-Urea)	20%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	0%
K ₂ O	Oxid draselný	7%
	vodorozpustný (K ₂ O)	7%
CaO	Oxid vápenatý	9%

vodorozpustný (CaO) 7%

MgO Oxid hořečnatý 3%
vodorozpustný (MgO) 2.5%

Výhody

- ▬ Výborný poměr cena/výkon
- ▬ Nepřetržité uvolňování živin po dobu 2-3 měsíců
- ▬ Optimální přísun živin pro zlepšení kvality trávníku

Dávkování

Doporučená dávka: 25 - 35 g/m²

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Návod k použití

- 1 Aplikujte na suché listy. Zálivka po aplikaci napomáhá rovnoměrnému rozptýlení, zrychluje počáteční účinek a omezuje stopy po obsluze. Vyhněte se aplikaci za mrazu či sucha.
- 2 Aplikace by měla probíhat po provzdušňování jako je aerifikace dutými hroty, propichování a/nebo skarifikace, aby nedošlo k poškození granulí.
- 3 Pokud dojde k rozsypání na chodníky, beton, šaty apod., okamžitě omyjte, protože produkt může způsobit odbarvení.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.
- 5 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 6 Skladujte v suchu.

Doporučené použití

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/turf-landscape/products/landscaper-pro-spring-summer/>

Poslední aktualizace: 18/07/2024